NOMBRE.....Número.....

Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería
Master Universitario en I. Caminos, C. y P. - Curso 2018-19

Examen Bloque I-EDP, 10-IX-2019

Observaciones: Escribir exactamente la solución donde se pide. Toda respuesta debe estar debidamente razonada donde se pide o en las hojas adjuntas grapadas. Indicar si se cambia de hoja en la resolución. .

EJERCICIO 1 (3.4p)

Resolver usando fórmulas o el método de separación de variables

EJERCICIO 1.1 (1p) Resolver el problema de valor inicial

$$u_t + 4u_x = 0, \quad x \in (-\infty, \infty),\ t > 0$$

$$u(x,0) = \sin(x), \quad x \in (-\infty, \infty).$$

SOLUCION:

EJERCICIO 1.2 (1.2p) Resolver el problema de valor inicial

$$u_t + \sin(t)u_x = 0, \quad x \in (-\infty, \infty),\ t > 0$$

$$u(x,0) = e^x, \quad x \in (-\infty, \infty).$$

SOLUCION:

RESOLUCION Y RAZONAMIENTOS

EJERCICIO 1.3 (1.2p)
Considerando las coordenadas polares $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, se plantea el problema de contorno para un modelo de calor estacionario una corona circular

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + \frac{4}{r^2}u = 0, \text{ para } r \in (1,2), \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$u(1,\theta) = 1, \quad u(2,\theta) = 1 \quad , \text{ para } \theta \in [0, 2\pi)$$

Encontrar una solución independiente de θ, esto es $u(r,\theta) = R(r)$

SOLUCIÓN:

RESOLUCION Y RAZONAMIENTOS

EJERCICIO 2 (6.6 p.)
Resolver el problema mixto para la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - 2u &= 0, \quad x \in (0,1), \quad t > 0, \\ u(x,0) &= f, \quad x \in (0,1), \\ u_t(x,0) &= 1, \quad x \in (0,1), \\ u(0,t) = u_x(1,t) &= 0, \quad t > 0. \end{cases}$$

donde $f(x) = \sin(2\pi x)$ para $x \in [0, 1/2]$, $f(x) = 0$ para $x \in [1/2, 1]$.

Escribir el desarrollo en serie de Fourier de los datos iniciales en término de las funciones propias encontradas. En particular, escribir claramente (calculando integrales) el primer y quinto coeficiente de fourier de $f(x)$. Asimismo, para la función $g(x) = 1$, escribir la aproximación que dan los tres primeros términos del desarrollo en serie de Fourier en el punto $x = 1/4$. Escribir condiciones de contorno para que $g(x) = 1$ sea un función propia

PROBLEMA DE VALORES PROPIOS y
valores propios y funciones propias

ECUACIONES en la variable t

COEFICIENTES DE FOURIER DE $f(x)$:
1er coeficiente y 5^0 coeficiente

APROXIMACION de $g(x) = 1$ en $x = 1/4$

SOLUCION DEL PROBLEMA:

POSIBLES NUEVAS CONDICIONES DE CONTORNO

RESOLUCION Y RAZONAMIENTOS

Ecuaciones Diferenciales
Formulario

-Método de variación de parámetros: cálculo de soluciones particulares

- E.D.O. de primer orden: $k(x) = \int q(x)\, \exp(\int p(x)dx)\, dx$

- E.D.O. de segundo orden:

$$K_1(x) = \int \frac{-r(x)y_2(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx \quad , \quad K_2(x) = \int \frac{r(x)y_1(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx.$$

- Sistemas de E.D.O.: $\bar{k}(x) = \int \Phi(x)^{-1}.\bar{b}(x)dx$

-Reducción de orden para E.D.O. de segundo orden:

$$c(x) = \int \frac{\exp(-\int p(x)dx)}{y_1(x)^2} dx$$

- Método de coeficientes indeterminados cálculo de soluciones particulares:

- Si $r(x) = p_k(x)e^{\alpha x}$, se busca $y_p(x) = x^s P_k(x)e^{\alpha x}$
- Si $r(x) = p_k(x)e^{\alpha x}\cos\beta x$ ó $r(x) = p_k(x)e^{\alpha x}\sin\beta x$,
  se busca $y_p(x) = x^s P_k(x)e^{\alpha x}\cos\beta x + x^s Q_k(x)e^{\alpha x}\sin\beta x$.

donde p_k, P_k, Q_k son polinomios de grado k,
$s = 0$ si $\alpha + i\beta$ no es raíz del polinomio característico, $s = n_i$ si $\alpha + i\beta$ es raíz del polinomio característico de multiplicidad n_i.

-Método de Euler para el problema $\bar{y}' = \bar{F}(t, \bar{y})$, $\bar{y}(x_0) = \bar{y}_0$:

$$x_{i+1} = x_i + h\,, \quad \bar{y}_{i+1} = \bar{y}_i + h\bar{F}(t_i, \bar{y}_i)$$

-Método de Elementos Finitos:

$$a_{ij} = -\int_a^b p(x)\varphi_i'(x)\varphi_j'(x)\, dx + \int_a^b q(x)\varphi_i(x)\varphi_j(x)\, dx$$

-Coeficientes de Fourier:

$$c_k = \frac{\int_a^b f(x)\phi_k(x)s(x)\, dx}{\int_a^b \phi_k(x)^2 s(x)\, dx}$$

Relaciones trigonométricas: $2\sin a\, \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$

$$2\sin a\, \cos b = \sin(a-b) + \sin(a+b)\,, \quad 2\cos a\, \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b)$$

$$(\sin a)^2 = \frac{1-\cos(2a)}{2}, \quad (\cos a)^2 = \frac{1+\cos(2a)}{2}$$