Contexto

Espacios de deformación de grupos Kleinianos libres, generados por un elemento parabólico y uno loxodrómico.

Se corresponden con representaciones en $PSL(2, \mathbb{C})$, discretas, fieles y que preservan el tipo, del grupo fundamental de una 3-variedad hiperbólica M obtenida estrangulando β_3 en un toro sólido de género 2.

Estudiamos estructuras geométricas en $\hat{M}$ estudiando la frontera de su núcleo convexo, homeomorfa a ∂M , y su lugar geométrico de plisado, en nuestro caso, un sistemas de curvas.

Definición

Un sistema de curvas γ es una familia de lazos simples, esenciales y disjuntos en ∂M , donde sus componentes son homotópicamente distintos.

Parametrización de clases de ∂M -homotopía de sistemas de curvas en ∂M . $[\gamma] \rightarrow \mathbf{p}(\gamma) = (q_1(\gamma), q_2(\gamma), p_1(\gamma), p_2(\gamma))$. Véase [1].

Ejemplo:

Dos tipos de cajas:

$$q_1(\gamma) = u_i + |x_i - y_i| \quad q_2(\gamma) = |x_i - y_i|$$

$$p_1(\gamma) = \epsilon_i |x_i - y_i|_b \quad p_2(\gamma) = \epsilon_i (u_i + |x_i - y_i|)$$

¿Cuándo dos sistemas de curvas no homótopos en ∂M son homótopos en M ?

Encontramos en cada clase de M -homotopía $[[\gamma]]$ un sistema de curvas representante γ^0 en ∂M , único salvo ∂M -homotopía.

Utilizamos homeomorfismos de $\text{Mod}_0^+(M)$: se extienden de ∂M a M y son homótopos a la identidad.

- Extensiones de giros de Dehn alrededor de curvas compresibles: α_2, δ y $\tau_{\alpha_2}^n(\delta), n \in \mathbb{Z}$.

- Involución hiperelíptica f .

TEOREMA

Sea γ un sistema de curvas en ∂M con $\mathbf{p}$ -coordenadas $\mathbf{p}(\gamma) = (q_1, q_2, p_1, p_2)$, entonces existe un sistema de curvas γ^0 en ∂M , M -homótopo al dado, con $\mathbf{p}$ -coordenadas $\mathbf{p}(\gamma^0) = (q_1(\gamma^0), q_2(\gamma^0), p_1(\gamma^0), p_2(\gamma^0))$ tales que $q_1(\gamma^0) \leq q_2(\gamma^0)$ y $0 \leq p_2(\gamma^0) < q_2(\gamma^0)$.

Además, el sistema de curvas γ^0 es único salvo ∂M -homotopía.

Lo demostramos:

1. Proposición

Sea γ un sistema de curvas en ∂M y g un homeomorfismo de M , entonces $q_2(g(\gamma)) = q_2$.

Iniciamos un proceso de "reducción" hasta conseguir que $q_1(g(\gamma)) \leq q_1$ mientras $q_2(g(\gamma)) = q_2$.

2. Proposición

Si $q_2 < q_1, p_1 > 0$ y $p_1 < q_1$, entonces

$$q_1(\tau_\delta(\gamma)) = \begin{cases} -q_1 + 2p_1 + 2 \max\{q_2, p_1\} & \text{si } \chi < 2p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \\ q_1 - 4p_1 & \text{si } 2p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \leq \chi \end{cases}$$

$$q_2(\tau_\delta(\gamma)) = q_2$$

$$p_1(\tau_\delta(\gamma)) = \begin{cases} -p_1 & \text{si } \chi < 2p_1 - \min\{q_2, p_1\} \\ q_1 - q_2 - 5p_1 + 2 \min\{q_2, p_1\} & \text{si } 2p_1 - \min\{q_2, p_1\} \leq \chi \\ & \text{y } \chi < 2p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \\ q_1 - q_2 - 3p_1 & \text{si } 2p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \leq \chi < 2p_1 \\ p_1 & \text{si } 2p_1 \leq \chi \end{cases}$$

$$p_2(\tau_\delta(\gamma)) = \begin{cases} 2 \min\{q_2, p_1\} + p_2 & \text{si } \chi < 2p_1 - \min\{q_2, p_1\} \\ -q_1 + q_2 + 4p_1 + p_2 & \text{si } 2p_1 - \min\{q_2, p_1\} \leq \chi < 2p_1 \\ p_2 & \text{si } 2p_1 \leq \chi \end{cases}$$

Corolario

Si $q_2 < q_1, p_1 > 0, p_1 < q_1$ y $\chi > p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2}$, entonces $q_1(\tau_\delta(\gamma)) < q_1$.

¿Y si q_1 no se reduce utilizando τ_δ ?

Proposición

- Si $q_2 < q_1, p_1 < 0, |p_1| < q_1$ y $\chi \leq |p_1| \leq q_2$, entonces $q_1(f(\gamma)) \leq q_2$.

4. Proposición

Sea γ un sistema de curvas con $\mathbf{p}(\gamma) = (q_1, q_2, p_1, p_2)$ tales que $p_1 > 0$ y $p_1 < q_1$, entonces existe $\tilde{g} \in \text{Mod}_0^+(M)$ tal que $\tilde{g}(\gamma)$ es un sistema de curvas con $q_1(\tilde{g}(\gamma)) < q_1$.

$$\tilde{g} \text{ es: } \tau_{\alpha_1}^{-1}(\delta) \text{ si } \chi < p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \text{ y } q_2 < p_1$$

$$f \circ \tau_\delta \text{ si } \chi < p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2} \text{ y } p_1 \leq q_2$$

$$f \circ \tau_\delta \text{ si } \chi = p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2}$$

$$\tau_\delta \text{ si } \chi > p_1 - \frac{\min\{q_2, p_1\}}{2}$$

5.

- En general para reducir q_1 : $g = \tau_{\alpha_1}^{\lfloor \frac{p_1}{q_1} \rfloor} \circ \tilde{g} \circ \tau_{\alpha_1}^{-\lfloor \frac{p_1}{q_1} \rfloor}$.
- Repetimos el proceso un número finito de veces: $q_1(g_{i+1} \circ g_i \circ \dots \circ g_1(\gamma)) \leq q_1(g_i \circ \dots \circ g_1(\gamma))$ para $i \in \{1, \dots, m-1\}$ y $q_1(g_m \circ g_{m-1} \circ \dots \circ g_2 \circ g_1(\gamma)) \leq q_2$.
- $q_2\left(\tau_{\alpha_2}^{-\lfloor \frac{p_2}{q_2} \rfloor}(\gamma)\right) > p_2\left(\tau_{\alpha_2}^{-\lfloor \frac{p_2}{q_2} \rfloor}(\gamma)\right) \geq 0$.
- Unicidad.

[1] L. Keen, J. Parker, C. Series, Combinatorics of simple closed curves on the twice punctured torus. Israel J. Math. 112 (1999), 29-60.